Interreg
România-Ungaria
Fondul European de Dezvoltare Regională

UNIUNEA EUROPEANĂ

MILVUS west

Nature Corner ROHU-14 dropia.eu

GUVERNUL ROMÂNIEI

HUNGARIAN GOVERNMENT

# Aspecte de monitorizare și conservare în cazul populației de dropii de la Salonta-Mezőgyán

Parteneriat pentru un viitor mai bun

www.interreg-rohu.eu

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene.

# Reducerea arealului dropiei în România



Sursă: Stănescu 1988

# Arealul populației est-panonice




Sursă: CMS Great Bustard MoU

# Reducerea arealului populației est-panonice




Sursă: Faragó1990, CMS Great Bustard MoU

# Arealul actual al populației est-panonice



Kiskunság

Tiszántúl

Sursă: www.grosstrappe.at/

# Zona Salonta - Mezőgyán







Sursă: www.grosstrappe.at , Milvus

# Observații în zona Salonta – Mezőgyán în perioada 2005-2018



Sursă: KMNP, Milvus Group

# Tendința populației de dropii din Ungaria




Sursă: http://termeszetvedelem.hu/

# Tendința populației de dropii est-panonice







Kiskunság

Tiszántúl

Sursă: termeszetvedeme.hu, grosstrappe.at

# Tendința (?) populației de dropii din zona Salonta – Mezőgyán în perioada 2007-2020






# Observații în zona Salonta – Mezőgyán în perioada 2005-2018



Sursă: KMNP, Milvus Csoport

# Monitorizarea dropiilor în perioada de iarnă

- Detectabilitate sporită, mai ales când este și zăpadă
- Dropiile formează grupuri
- În mare parte masculii și femelele stau separat, se pot număra mai ușor pe sexe
- În perioadele de ger drumurile sunt practicabile, se pot acoperi suprafețe mai mari cu mașina
- **Cea mai bună metodă pentru a putea identifica cele mai multe exemplare posibile**

# Monitorizarea dropiilor în perioada de iarnă – evaluare sincronizată în Câmpia Panonică



# Monitorizarea dropiilor în perioada de rotit

- Majoritatea dropiilor stau în preajma principalelor zone de rotit în prima parte a perioadei de împerechere
- După prima fază, mulți dintre masculi se dispersează în zonele lor solitare de rotit („exploded lek”), fiind vizitate de femele
- În această a doua parte e mult mai greu să fie găsite „toate” exemplarele, este nevoie de evaluări sincronizate
- Rezultatele evaluărilor la locurile de rotit pot fi confruntate cu cele obținute iarna, chiar pe sexe

# Monitorizarea dropiilor în perioada de creștere a puilor

- Se încearcă identificarea femelelor cuibăritoare începând cu ultima parte a perioadei de împerechere
- În prima fază se urmărește mișcările femelelor care încă vizitează masculii în locurile acestora de rotit, după care însă se deplasează să caute locuri de cuibărit
- Prin urmărirea acestor mișcări repetate ale femelelor se pot identifica viitoarele locuri de cuibărit
- Este o metodă care necesită foarte mult timp, iar dacă cuibăritul eșuează, și femelele se împerechează / cuibăresc din nou, aceste perioade nu se mai suprapun neapărat în cazul mai multor femele, și urmărirea tuturor exemplarelor devine aproape imposibilă

# Monitorizarea dropiilor în perioada de creștere a puilor

- Se încearcă identificarea femelelor cu pui mari, în luna iulie
- Se verifică posibilele locuri de cuibărire găsite în perioada de cuibărit
- Femelele văzute în această perioadă în grupuri ori nu au cuibărit, ori au eșuat
- Este o metodă care iarăși necesită foarte mult timp, dar în cazul în care o parte însemnată a femelelor pot fi identificate, prin această metodă se poate estima succesul de cuibărit din acel an

*Nagy Attila – Grupul Milvus*